

動物用

外用液劑

蚤不到全效滴劑(大型犬) FRONTLINE PLUS FOR DOGS L

動物藥入字第 06669 號

用於 8 週齡或以上犬隻，以滴劑方式投藥，能快速作用，並控制跳蚤及壁蝨感染症。

成份

每 ml 中含有：

Fipronil.....100 mg
(S)-Methoprene.....90 mg

請放置於孩童接觸不到的地方。

效能

用於犬隻以預防及控制跳蚤及壁蝨感染症。

特性

本劑能提供快速、有效及方便的投藥方式，以預防及控制犬隻跳蚤及壁蝨感染症。

- 停止及預防感染。
- 殺滅成蚤、蚤卵及幼蚤。
- 避免跳蚤生活史各階段的發育(卵、幼蟲、蛹)。
- 殺滅可能造成跳蚤過敏性皮膚炎的成蚤。
- 殺滅各階段的鹿壁蝨(可能帶有萊姆病)、棕色狗壁蝨、美國狗壁蝨及長星壁蝨。
- 預防及控制再感染。
- 快速作用。
- 長效維持。
- 耐水沖洗。
- 使用方便。

本劑中含有 fipronil 及昆蟲生長調節劑(IGR)成份(S)-methoprene，針對跳蚤生活史中的各階段。Fipronil 可以蓄積在皮膚油脂及毛囊內，再持續由毛囊釋放出來至皮膚表面，使其有長效對抗跳蚤及壁蝨。

用法

請不要讓孩童使用本產品。為避免傷害您及您寵物，每次使用前請先閱讀所有標籤及仿單內容，遵循所有操作步驟。僅可用於犬隻。請不要用於兔子及其他動物。殺滅各階段的跳蚤、棕色狗壁蝨、美國狗壁蝨、長星壁蝨及鹿壁蝨(可能帶有萊姆病)。用於八週齡或以上犬隻，使用方法如下：

從包裝中取出滴管，將滴管朝上，折斷滴管頭。將滴管頭直接接觸肩胛骨間之皮膚，擠壓滴管，使滴管中之藥液全數滴在動物皮膚上，避免滴在動物毛髮上。每次使用一整管。

使用頻率

每月使用一次，可以完全阻斷跳蚤生活史，控制壁蝨感染。研究顯示，本劑殺滅成蚤、蚤卵及幼蚤的效果可達三個月，亦可避免跳蚤生活史各階段的發育達三個月。殺滅壁蝨的效果則可達一個月，故若需控制壁蝨感染，則推薦每月使用一次。雖然本劑能控制跳蚤達三個月，但若再感染的機會很大，或動物可能罹患跳蚤

過敏性皮膚炎，則必須每月投藥一次。使用本劑後，即使洗澡、浸水或日曬，都不致影響其效力。投藥部位自然乾燥前請不要碰觸。請不要在 30 天內重複使用。

儲存及處理

在儲存或使用後丟棄時，請勿污染水源、食物或飼料。

未使用過之產品以原包裝型式儲存，壁免孩童及動物接觸。

使用後剩餘之產品請丟棄於合法之廢棄物處理場所，空瓶請以數層報紙確實包裹後丟棄。

特別注意

若有誤用於人而必須送醫的情形，請攜帶包裝瓶或標籤。

倘若被人誤食，請儘速聯絡醫師。若仍能吞嚥，先使其喝下一杯水。除非經醫師囑咐，否則不應催吐。昏迷者不應經口給予任何物體。

倘若誤接觸眼睛，請以大量清水沖洗，如若持續刺痛，應送醫。

倘若接觸皮膚，請以香皂及清水沖洗。如若持續刺痛，應送醫。

注意事項

若被人類誤食，有危險性。會造成眼睛刺激。應避免接觸皮膚、眼睛或衣物。使用本產品後應以香皂及清水徹底清洗。

僅可外用，勿用於 8 週齡以下幼犬。雖然罕見，但仍有可能出現對驅外寄生蟲劑敏感的個體。可能在投藥部位出現暫時性的刺激。如果症狀持續不退，亦或在使用後數天內症狀加劇，請立即與獸醫師連繫。部份藥物可能會與驅外寄生蟲劑相互作用，故若欲用於治療中、疲弱、年老、懷孕或哺乳中的動物，可先向獸醫師諮詢。

請勿在近熱源或火源處儲存或使用本產品。

包裝

為方便使用，本產品依不同體重動物分為不同包裝，分別為：

0.67 ml / 管—適用於小型犬及 8 週齡或以上幼犬，體重在 5 至 10 kg (11 至 22 磅)之間

1.34 ml / 管—適用於中型犬，體重在 10 至 20 kg (23 至 44 磅)之間

2.68 ml / 管—適用於大型犬，體重在 20 至 40 kg (45 至 88 磅)之間。

每盒 3 管。

製造廠商：MERIAL Laboratoire de Toulouse

代理商：台灣龍馬躍股份有限公司

地址：台北市內湖區行忠路 51 號 3 樓

電話：(02)2794-1569

§ 有效期及製造批號請參閱原廠包裝 §



動物用

外用液劑

蚤不到全效滴劑(中型犬)

FRONTLINE PLUS FOR DOGS M

動物藥入字第 06670 號

用於 8 週齡或以上犬隻，以滴劑方式投藥，能快速作用，並控制跳蚤及壁蝨感染症。

成份

每 ml 中含有：

Fipronil.....100 mg
(S)-Methoprene.....90 mg

請放置於孩童接觸不到的地方。

效能

用於犬隻以預防及控制跳蚤及壁蝨感染症。

特性

本劑能提供快速、有效及方便的投藥方式，以預防及控制犬隻跳蚤及壁蝨感染症。

- 停止及預防感染。
- 殺滅成蚤、蚤卵及幼蚤。
- 避免跳蚤生活史各階段的發育(卵、幼蟲、蛹)。
- 殺滅可能造成跳蚤過敏性皮膚炎的成蚤。
- 殺滅各階段的鹿壁蝨(可能帶有萊姆病)、棕色狗壁蝨、美國狗壁蝨及長星壁蝨。
- 預防及控制再感染。
- 快速作用。
- 長效維持。
- 耐水沖洗。
- 使用方便。

本劑中含有 fipronil 及昆蟲生長調節劑(IGR)成份(S)-methoprene，針對跳蚤生活史中的各階段。Fipronil 可以蓄積在皮膚油脂及毛囊內，再持續由毛囊釋放出來至皮膚表面，使其有長效對抗跳蚤及壁蝨。

用法

請不要讓孩童使用本產品。為避免傷害您及您寵物，每次使用前請先閱讀所有標籤及仿單內容，遵循所有操作步驟。僅可用於犬隻。請不要用於兔子及其他動物。殺滅各階段的跳蚤、棕色狗壁蝨、美國狗壁蝨、長星壁蝨及鹿壁蝨(可能帶有萊姆病)。用於八週齡或以上犬隻，使用方法如下：

從包裝中取出滴管，將滴管朝上，折斷滴管頭。將滴管頭直接接觸肩胛骨間之皮膚，擠壓滴管，使滴管中之藥液全數滴在動物皮膚上，避免滴在動物毛髮上。每次使用一整管。

使用頻率

每月使用一次，可以完全阻斷跳蚤生活史，控制壁蝨感染。研究顯示，本劑殺滅成蚤、蚤卵及幼蚤的效果可達三個月，亦可避免跳蚤生活史各階段的發育達三個月。殺滅壁蝨的效果則可達一個月，故若需控制壁蝨感染，則推薦每月使用一次。雖然本劑能控制跳蚤達三個月，但若再感染的機會很大，或動物可能罹患跳蚤

過敏性皮膚炎，則必須每月投藥一次。使用本劑後，即使洗澡、浸水或日曬，都不致影響其效力。投藥部位自然乾燥前請不要碰觸。請不要在 30 天內重複使用。

儲存及處理

在儲存或使用後丟棄時，請勿污染水源、食物或飼料。

未使用過之產品以原包裝型式儲存，避免孩童及動物接觸。

使用後剩餘之產品請丟棄於合法之廢棄物處理場所，空瓶請以數層報紙確實包裹後丟棄。

特別注意

若有誤用於人而必須送醫的情形，請攜帶包裝瓶或標籤。

倘若被人誤食，請儘速聯絡醫師。若仍能吞嚥，先使其喝下一杯水。除非經醫師囑咐，否則不應催吐。昏迷者不應經口給予任何物體。

倘若誤接觸眼睛，請以大量清水沖洗，如若持續刺痛，應送醫。

倘若接觸皮膚，請以香皂及清水沖洗。如若持續刺痛，應送醫。

注意事項

若被人類誤食，有危險性。會造成眼睛刺激。應避免接觸皮膚、眼睛或衣物。使用本產品後應以香皂及清水徹底清洗。

僅可外用，勿用於 8 週齡以下幼犬。雖然罕見，但仍有可能出現對驅外寄生蟲劑敏感的個體。可能在投藥部位出現暫時性的刺激。如果症狀持續不退，亦或在使用後數天內症狀加劇，請立即與獸醫師連繫。部份藥物可能會與驅外寄生蟲劑相互作用，故若欲用於治療中、疲弱、年老、懷孕或哺乳中的動物，可先向獸醫師諮詢。

請勿在近熱源或火源處儲存或使用本產品。

包裝

為方便使用，本產品依不同體重動物分為不同包裝，分別為：

0.67 ml / 管—適用於小型犬及 8 週齡或以上幼犬，體重在 5 至 10 kg (11 至 22 磅)之間

1.34 ml / 管—適用於中型犬，體重在 10 至 20 kg (23 至 44 磅)之間

2.68 ml / 管—適用於大型犬，體重在 20 至 40 kg (45 至 88 磅)之間。

每盒 3 管。

製造廠商：MERIAL Laboratoire de Toulouse

代理商：台灣龍馬躍股份有限公司

地址：台北市內湖區行忠路 51 號 3 樓

電話：(02)2794-1569

§ 有效期及製造批號請參閱原廠包裝 §



動物用

外用液劑

蚤不到全效滴劑(小型犬) FRONTLINE PLUS FOR DOGS S

動物藥入字第 06671 號

用於 8 週齡或以上犬隻，以滴劑方式投藥，能快速作用，並控制跳蚤及壁蝨感染症。

成份

每 ml 中含有：

Fipronil.....100 mg
(S)-Methoprene.....90 mg

請放置於孩童接觸不到的地方。

效能

用於犬隻以預防及控制跳蚤及壁蝨感染症。

特性

本劑能提供快速、有效及方便的投藥方式，以預防及控制犬隻跳蚤及壁蝨感染症。

- 停止及預防感染。
- 殺滅成蚤、蚤卵及幼蚤。
- 避免跳蚤生活史各階段的發育(卵、幼蟲、蛹)。
- 殺滅可能造成跳蚤過敏性皮膚炎的成蚤。
- 殺滅各階段的鹿壁蝨(可能帶有萊姆病)、棕色狗壁蝨、美國狗壁蝨及長星壁蝨。
- 預防及控制再感染。
- 快速作用。
- 長效維持。
- 耐水沖洗。
- 使用方便。

本劑中含有 fipronil 及昆蟲生長調節劑(IGR)成份(S)-methoprene，針對跳蚤生活史中的各階段。Fipronil 可以蓄積在皮膚油脂及毛囊內，再持續由毛囊釋放出來至皮膚表面，使其有長效對抗跳蚤及壁蝨。

用法

請不要讓孩童使用本產品。為避免傷害您及您寵物，每次使用前請先閱讀所有標籤及仿單內容，遵循所有操作步驟。僅可用於犬隻。請不要用於兔子及其他動物。殺滅各階段的跳蚤、棕色狗壁蝨、美國狗壁蝨、長星壁蝨及鹿壁蝨(可能帶有萊姆病)。用於八週齡或以上犬隻，使用方法如下：

從包裝中取出滴管，將滴管朝上，折斷滴管頭。將滴管頭直接接觸肩胛骨間之皮膚，擠壓滴管，使滴管中之藥液全數滴在動物皮膚上，避免滴在動物毛髮上。每次使用一整管。

使用頻率

每月使用一次，可以完全阻斷跳蚤生活史，控制壁蝨感染。研究顯示，本劑殺滅成蚤、蚤卵及幼蚤的效果可達三個月，亦可避免跳蚤生活史各階段的發育達三個月。殺滅壁蝨的效果則可達一個月，故若需控制壁蝨感染，則推薦每月使用一次。雖然本劑能控制跳蚤達三個月，但若再感染的機會很大，或動物可能罹患跳蚤

過敏性皮膚炎，則必須每月投藥一次。使用本劑後，即使洗澡、浸水或日曬，都不致影響其效力。投藥部位自然乾燥前請不要碰觸。請不要在 30 天內重複使用。

儲存及處理

在儲存或使用後丟棄時，請勿污染水源、食物或飼料。

未使用過之產品以原包裝型式儲存，避免孩童及動物接觸。

使用後剩餘之產品請丟棄於合法之廢棄物處理場所，空瓶請以數層報紙確實包裹後丟棄。

特別注意

若有誤用於人而必須送醫的情形，請攜帶包裝瓶或標籤。

倘若被人誤食，請儘速聯絡醫師。若仍能吞嚥，先使其喝下一杯水。除非經醫師囑咐，否則不應催吐。昏迷者不應經口給予任何物體。

倘若誤接觸眼睛，請以大量清水沖洗，如若持續刺痛，應送醫。

倘若接觸皮膚，請以香皂及清水沖洗。如若持續刺痛，應送醫。

注意事項

若被人類誤食，有危險性。會造成眼睛刺激。應避免接觸皮膚、眼睛或衣物。使用本產品後應以香皂及清水徹底清洗。

僅可外用，勿用於 8 週齡以下幼犬。雖然罕見，但仍有可能出現對驅外寄生蟲劑敏感的個體。可能在投藥部位出現暫時性的刺激。如果症狀持續不退，亦或在使用後數天內症狀加劇，請立即與獸醫師連繫。部份藥物可能會與驅外寄生蟲劑相互作用，故若欲用於治療中、疲弱、年老、懷孕或哺乳中的動物，可先向獸醫師諮詢。

請勿在近熱源或火源處儲存或使用本產品。

包裝

為方便使用，本產品依不同體重動物分為不同包裝，分別為：

0.67 ml / 管—適用於小型犬及 8 週齡或以上幼犬，體重在 5 至 10 kg (11 至 22 磅)之間

1.34 ml / 管—適用於中型犬，體重在 10 至 20 kg (23 至 44 磅)之間

2.68 ml / 管—適用於大型犬，體重在 20 至 40 kg (45 至 88 磅)之間。

每盒 3 管。

製造廠商：MERIAL Laboratoire de Toulouse

代理商：台灣龍馬躍股份有限公司

地址：台北市內湖區行忠路 51 號 3 樓

電話：(02)2794-1569

§ 有效期及製造批號請參閱原廠包裝 §

