

HEARTGARD® CHEWABLES FOR CATS

成份：每錠中含有 0.165 mg 之 ivermectin。

效能：預防貓感染貓心絲蟲症，遭感染後清除組織階段心絲蟲幼蟲(*Dirofilaria immitis*)的效力可達一個月(30 天)，並可清除和控制成熟和未成熟的鉤蟲(*Ancylostoma tubaeforme* 及 *A. braziliense*)。

用量：每月口服一次，每次投予劑量為至少 24 mcg ivermectin/kg(10.9 mcg/lb)。預防貓心絲蟲症及控制鉤蟲的推薦劑量如下：

貓體重	每月投藥量(錠)	每錠 ivermectin 含量	包裝盒顏色
5 lb (2.27 kg)以下	1	55 mcg	紅
5-15 lb (2.27-6.81 kg)	1	165 mcg	紫

體重超過 15 lb(6.81 公斤)的貓請酌量混合不同藥量的錠劑投予。

本劑只推薦用於 6 週齡及以上的貓。

用法：每次只取出足夠的錠劑量，剩餘的錠劑請放回盒中，避免光照。本劑可直接以手餵食，或與少量飼料混合餵食。若需以手餵食，可先將本劑剝碎後再行投藥。投藥當日，飼料請正常給予。若貓正處於禁食狀態，或以手餵食時未將本劑剝碎投予，則可能降低其吸收的能力，但並無證據顯示吸收力降低會造成藥效降低。在投藥後必須確定貓已完全服用足量的本劑，並觀察數分鐘，確保未有任何漏失。若有未完全服下的可能，建議再投藥一次。貓投藥後可能在其糞便中出現未完全消化的碎片，但效力並不會因此受到影響。在蚊子可能傳播心絲蟲感染性仔蟲的盛行期，請每月投藥一次。在暴露於有蚊子的環境中的第一個月(30 天)內，必須開始投藥；而在最後一次暴露於有蚊子的環境中後的一個月(30 天)內，進行最後一次投藥。為達到最好的效果，本劑必須每月投藥一次。若超過一個月未投藥，請立即以推薦劑量投予本劑，以使心絲蟲幼蟲發育為成蟲的機率降至最低。貓在開始投藥前應先檢查是否已遭心絲蟲感染，若已有心絲蟲成蟲感染，仍能每月投予本劑，以預防更進一步的感染。每月投予本劑也可以有效的清除和控制成熟及未

成熟的鉤蟲(*A. tubaeforme* 及 *A. braziliense*)。

安全性：本劑在經超過 3000 劑之臨床投藥中，投藥後 24 小時內之反應包括： $\leq 0.3\%$ 的動物有嘔吐的現象， $\leq 0.2\%$ 的動物有下痢的現象，但在投予本劑之實驗組與只投予本劑之賦形劑之對照組間，並無統計學上的差異。不論是在臨床試驗中將本劑以推薦劑量投予 6 週齡或以上的幼貓或貓，或是在實驗室試驗中將本劑投予循環系統中已有心絲蟲幼蟲的貓，在在顯示本劑的安全性。本劑以 3 倍推薦劑量投予懷孕母貓或種公及種母貓也是安全的，投藥公貓、母貓或其子代中，都未出現不良反應。在單一劑量投藥的耐受性試驗中，其安全範圍可達推薦劑量的 30 倍。在幼貓的連續投藥試驗中，幼貓連續 8 個月每月投藥，其中一隻投予 5 倍推薦劑量的貓出現嘔吐的現象，另一隻貓在投藥後 24 小時內出現下痢的現象。於臨床應用時，本劑可與一些常用的防蚤產品、驅線蟲藥、疫苗、抗生素及固醇類製劑一起使用。

注意事項：勿使孩童接觸藥品。若被人類誤食，必須即刻與醫師聯絡。

安定性：本劑在儲存於 25°C(77°F)以下且避免光線照射時，可儲放至少 2 年，故建議儲放於室溫 20-25°C(68-77°F)的環境中。但短時間儲放於 15-30°C(59-86°F)的環境條件下仍是在被許可的範圍內。

包裝：本劑依貓不同體重分為二種劑量包裝(見用量部份)，每種劑量包裝為每盒 6 錠。

製造商：Merck Sharp & Dohme Quimica de Puerto Rico, Inc.

地址：Rd #2 KM. 56.7, Barceloneta, Puerto Rico USA

供應商：MERIAL Limited, USA

代理商：台灣龍馬躍股份有限公司

地址：台北市內湖區行忠路 51 號 3 樓

電話：(02)2794-1569

§ 本藥品由飼主、畜禽水產養殖業者或飼料廠依獸醫師(佐)處方使用 §

§ 有效期及製造批號請參閱原廠盒蓋 §



HEARTGARD® CHEWABLES FOR CATS

成份：每錠中含有 0.055 mg 之 ivermectin。

效能：預防貓感染貓心絲蟲症，遭感染後清除組織階段心絲蟲幼蟲(*Dirofilaria immitis*)的效力可達一個月(30 天)，並可清除和控制成熟和未成熟的鉤蟲(*Ancylostoma tubaeforme* 及 *A. braziliense*)。

用量：每月口服一次，每次投予劑量為至少 24 mcg ivermectin/kg(10.9 mcg/lb)。預防貓心絲蟲症及控制鉤蟲的推薦劑量如下：

貓體重	每月投藥量(錠)	每錠 ivermectin 含量	包裝盒顏色
5 lb (2.27 kg)以下	1	55 mcg	紅
5-15 lb (2.27-6.81 kg)	1	165 mcg	紫

體重超過 15 lb(6.81 公斤)的貓請酌量混合不同藥量的錠劑投予。

本劑只推薦用於 6 週齡及以上的貓。

用法：每次只取出足夠的錠劑量，剩餘的錠劑請放回盒中，避免光照。本劑可直接以手餵食，或與少量飼料混合餵食。若需以手餵食，可先將本劑剝碎後再行投藥。投藥當日，飼料請正常給予。若貓正處於禁食狀態，或以手餵食時未將本劑剝碎投予，則可能降低其吸收的能力，但並無證據顯示吸收力降低會造成藥效降低。在投藥後必須確定貓已完全服用足量的本劑，並觀察數分鐘，確保未有任何漏失。若有未完全服下的可能，建議再投藥一次。貓投藥後可能在其糞便中出現未完全消化的碎片，但效力並不會因此受到影響。在蚊子可能傳播心絲蟲感染性仔蟲的盛行期，請每月投藥一次。在暴露於有蚊子的環境中的第一個月(30 天)內，必須開始投藥；而在最後一次暴露於有蚊子的環境中後的一個月(30 天)內，進行最後一次投藥。為達到最好的效果，本劑必須每月投藥一次。若超過一個月未投藥，請立即以推薦劑量投予本劑，以使心絲蟲幼蟲發育為成蟲的機率降至最低。貓在開始投藥前應先檢查是否已遭心絲蟲感染，若已有心絲蟲成蟲感染，仍能每月投予本劑，以預防更進一步的感染。每月投予本劑也可以有效的清除和控制成熟及未

成熟的鉤蟲(*A. tubaeforme* 及 *A. braziliense*)。

安全性：本劑在經超過 3000 劑之臨床投藥中，投藥後 24 小時內之反應包括： $\leq 0.3\%$ 的動物有嘔吐的現象， $\leq 0.2\%$ 的動物有下痢的現象，但在投予本劑之實驗組與只投予本劑之賦形劑之對照組間，並無統計學上的差異。不論是在臨床試驗中將本劑以推薦劑量投予 6 週齡或以上的幼貓或貓，或是在實驗室試驗中將本劑投予循環系統中已有心絲蟲幼蟲的貓，在在顯示本劑的安全性。本劑以 3 倍推薦劑量投予懷孕母貓或種公及種母貓也是安全的，投藥公貓、母貓或其子代中，都未出現不良反應。在單一劑量投藥的耐受性試驗中，其安全範圍可達推薦劑量的 30 倍。在幼貓的連續投藥試驗中，幼貓連續 8 個月每月投藥，其中一隻投予 5 倍推薦劑量的貓出現嘔吐的現象，另一隻貓在投藥後 24 小時內出現下痢的現象。於臨床應用時，本劑可與一些常用的防蚤產品、驅線蟲藥、疫苗、抗生素及固醇類製劑一起使用。

注意事項：勿使孩童接觸藥品。若被人類誤食，必須即刻與醫師聯絡。

安定性：本劑在儲存於 25°C(77°F)以下且避免光線照射時，可儲放至少 2 年，故建議儲放於室溫 20-25°C(68-77°F)的環境中。但短時間儲放於 15-30°C(59-86°F)的環境條件下仍是在被許可的範圍內。

包裝：本劑依貓不同體重分為二種劑量包裝(見用量部份)，每種劑量包裝為每盒 6 錠。

製造商：Merck Sharp & Dohme Quimica de Puerto Rico, Inc.

地址：Rd #2 KM. 56.7, Barceloneta, Puerto Rico USA

供應商：MERIAL Limited, USA

代理商：台灣龍馬躍股份有限公司

地址：台北市內湖區行忠路 51 號 3 樓

電話：(02)2794-1569

§ 本藥品由飼主、畜禽水產養殖業者或飼料廠依獸醫師(佐)處方使用 §

§ 有效期及製造批號請參閱原廠盒蓋 §

